

**COMITE DE L'ANTIBIOGRAMME DE LA SOCIETE FRANCAISE DE MICROBIOLOGIE**

**COMMUNIQUE 2000-2001**

Coordonnateur: Pr C.J. SOUSSY.  
Centre Hospitalier Universitaire Henri Mondor.  
94010 Créteil Cedex  
Tél. : 01 49 81 28 31 - Fax. : 01 49 81 28 39  
E-mail : [claire-james.soussy@hmn.ap-hop-paris.fr](mailto:claire-james.soussy@hmn.ap-hop-paris.fr)

Membres : G. CARRET, J.D. CAVALLO, H. CHARDON, C. CHIDIAC, P. CHOUTET,  
P. COURVALIN, H. DABERNAT, H. DRUGEON, L. DUBREUIL, F. GOLDSTEIN, V. JARLIER,  
R. LECLERCQ, M.H. NICOLAS-CHANOINE, A. PHILIPPON, C. QUENTIN, B. ROUVEIX,  
J. SIROT, C.-J. SOUSSY.

Ce document peut être téléchargé depuis le site internet de la Société Française de Microbiologie : <http://www.sfm.asso.fr/>

## SOMMAIRE

Valeurs critiques pour l'antibiogramme	Page 2
Procédure de catégorisation	Page 2
Conditions techniques générales pour les méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé	Page 3
Contrôle de qualité interne	Page 7
Concentrations et diamètres critiques pour les diverses classes d'antibiotiques	Page 8
Résistances naturelles aux antibiotiques des principales espèces bactériennes d'intérêt médical	Page 14
Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien	Page 17
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Enterobacteriaceae</i>	Page 25
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Page 29
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Acinetobacter</i> spp.	Page 31
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	Page 31
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Burkholderia cepacia</i>	Page 31
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Staphylococcus</i> spp.	Page 32
Détermination de l'activité <i>in vitro</i> des glycopeptides sur <i>Staphylococcus aureus</i>	Page 33
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Enterococcus</i> spp.	Page 34
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Streptococcus pneumoniae</i>	Page 36
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Streptococcus</i> spp.	Page 38
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Haemophilus influenzae</i>	Page 40
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Neisseria meningitidis</i>	Page 42
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Neisseria gonorrhoeae</i>	Page 43
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Campylobacter</i> spp.	Page 44
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour <i>Helicobacter pylori</i>	Page 44
Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour les anaérobies stricts	Page 45

© Copyright 2000 - **Société Française de Microbiologie**

Tous droits de traduction, d'adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle par quelque procédé que ce soit de ce document, faite sans autorisation expresse et écrite du Comité de l'antibiogramme de la Société Française de Microbiologie (28, rue du Docteur Roux, 75724 Paris Cedex 15) est illicite et constitue une contrefaçon. Seules sont autorisées, d'une part, les reproductions strictement réservées à l'usage du copiste et non-déterminées à une utilisation collective, et d'autre part, les courtes citations justifiées par le caractère scientifique ou d'information de l'œuvre dans laquelle elles sont incorporées (art. L. 122-4, L. 122-5 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle).

A la suite des recommandations du Comité d'Experts de la Standardisation biologique de l'OMS (rapports techniques n° 610, 1977), la Société Française de Microbiologie a créé un Comité de l'Antibiogramme (CA-SFM) chargé de proposer les valeurs critiques qui délimitent les catégories cliniques (antérieurement catégories thérapeutiques). Les concentrations et diamètres critiques correspondants, ainsi que les recommandations spécifiques à certaines espèces ou à certains groupes d'antibiotiques, sont publiés dans un communiqué annuel.

#### VALEURS CRITIQUES POUR L'ANTIBIOGRAMME

Les valeurs des concentrations et des diamètres critiques qui délimitent les catégories résultent de l'intégration de plusieurs données : distribution des concentrations minimales inhibitrices (CMI) pour les populations de souches sensibles et résistantes appartenant à diverses espèces, concentrations humorales et tissulaires obtenues avec les posologies recommandées dans le résumé des caractéristiques du produit (RCP) rédigé par l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS), confrontation des résultats *in vitro* et des résultats cliniques, variabilité statistique des méthodes utilisées.

#### DEFINITION DES CATEGORIES CLINIQUES

Trois catégories cliniques ont été retenues pour l'interprétation des tests de sensibilité *in vitro* : Sensible (S), Résistant (R) et Intermédiaire (I) .

#### Sensible

Les souches **S** sont celles pour lesquelles la probabilité de succès thérapeutique est forte dans le cas d'un traitement par voie systémique avec la posologie recommandée (RCP).

#### Résistant

Les souches **R** sont celles pour lesquelles il existe une forte probabilité d'échec thérapeutique quel que soit le type de traitement.

#### Intermédiaire

Les souches **I** sont celles pour lesquelles le succès thérapeutique est imprévisible.

Ces souches forment un ensemble hétérogène pour lequel la seule valeur de la CMI n'est pas prédictive de succès thérapeutique :

- elles peuvent présenter un mécanisme de résistance dont l'expression *in vitro* est faible, pouvant entraîner leur classement dans la catégorie S. Cependant, *in vivo*, une partie de ces souches apparaissent résistantes à la thérapeutique ;
- elles peuvent présenter un mécanisme de résistance dont l'expression n'est pas suffisante pour justifier un classement dans la catégorie R, mais qui favorise l'apparition d'une résistance *in vivo* en cours de traitement ;
- elles peuvent présenter un mécanisme de résistance dont l'expression n'est pas suffisante pour justifier un classement dans la catégorie R, mais qui permet d'espérer un effet thérapeutique dans certaines conditions (fortes concentrations locales ou posologies accrues) ;
- la catégorie intermédiaire est aussi une zone tampon qui tient compte des incertitudes techniques et biologiques (les souches, pour lesquelles les CMI sont au voisinage des concentrations critiques, peuvent être, en raison de ces incertitudes, accidentellement catégorisées I).

#### PROCEDURE DE CATEGORISATION

#### Selon les valeurs critiques

Pour les principaux agents antimicrobiens, des valeurs critiques des concentrations basse (c) et haute (C) et des diamètres d'inhibition correspondants (D,d) permettent la catégorisation selon les critères figurant dans le tableau I. Pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, des critères spécifiques ont été retenus.

**Tableau I - Critères de catégorisation selon les valeurs critiques.**

Catégories	CMI (mg/L)	Diamètres ( ) (mm)
S	CMI < c	D
R	CMI > C	< d
I	c < CMI < C	d < D

#### Lecture interprétative de l'antibiogramme

La lecture interprétative de l'antibiogramme, fondée sur la connaissance des phénotypes de résistance, a pour but de transformer un résultat initialement catégorisé S, selon les valeurs critiques, en résultat I ou R en raison d'un risque d'échec thérapeutique. Elle requiert au préalable l'identification correcte de la souche bactérienne et une méthode d'antibiogramme standardisée. Elle n'a pas pour but d'identifier formellement le ou les mécanismes de résistance impliqués, démarche qui impose la mise en place de techniques spécifiques.

Les règles de lecture interprétative sont mentionnées, pour certaines espèces ou pour certains groupes bactériens, dans les notes additionnelles des tableaux VII à XIX.

## CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES POUR LES METHODES DE DILUTION ET DE DIFFUSION EN MILIEU GELOSE

(Bull. Soc. Fr. Microbiol., 1993, 8, 156-66 ; Clin. Microbiol. Infect. 1996, 2, Suppl. 1)

**Enterobacteriaceae, bacilles à Gram négatif non fermentaires**  
**(*Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter* spp., *Stenotrophomonas maltophilia*, *Burkholderia cepacia* ...), *Staphylococcus* spp., *Enterococcus* spp.**  
**(Tableaux VII à XI)**

### - Inoculum

A partir d'une culture de 18-24 h sur milieu gélosé non sélectif, préparer une suspension en bouillon Mueller Hinton ou en solution saline (0,9 % NaCl) équivalente au standard McFarland 0,5 (~ 10<sup>8</sup> UFC/ml). Cette suspension peut également être préparée à partir d'une culture en bouillon Mueller Hinton obtenue après incubation à 37° C au bain-marie agité pendant 3 à 5 h, et dont la densité est ajustée au standard McFarland 0,5.

### - Milieu

Gélose Mueller Hinton

### - Ensemencement

- méthode de dilution : diluer la suspension inoculum au 1/10 et déposer 1 à 2 µl, soit ~ 10<sup>4</sup> UFC par spot.

- méthode de diffusion : diluer la suspension inoculum au 1/100 (~ 10<sup>6</sup> UFC/ml) et ensemercer par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires.

### - Lecture

Après 18-24 h d'incubation à 35-37° C.

***Streptococcus pneumoniae*, *Streptococcus* spp.**  
**(Tableaux XII et XIII)**

### - Inoculum

A partir d'une culture de 18-24 h sur gélose Mueller Hinton additionnée de 5 % de sang de mouton, préparer une suspension en bouillon Mueller Hinton ou en solution saline (0,9 % NaCl) équivalente au standard McFarland 0,5 (~10<sup>8</sup> UFC/ml)

### - Milieu

Gélose Mueller Hinton additionnée de 5 % de sang de mouton.

Pour le cotrimoxazole, utiliser une gélose Mueller Hinton + 5 % de sang de cheval hémolysé.

### - Ensemencement

- méthode de dilution : diluer la suspension inoculum au 1/10 et déposer 1 à 2 µl, soit ~ 10<sup>4</sup> UFC par spot.

- méthode de diffusion : diluer la suspension inoculum au 1/10 (~ 10<sup>7</sup> UFC/ml) et ensemercer par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires.

### - Lecture

Après 18-24 h d'incubation à 35-37° C en atmosphère contenant 5 % de CO<sub>2</sub>.

***Haemophilus influenzae***  
**(Tableau XIV)**

**- Inoculum**

A partir d'une culture de 18-24 h sur gélose chocolat PolyViteX<sup>®</sup>, préparer une suspension en bouillon Mueller Hinton ou en solution saline (0,9 % NaCl) équivalente au standard McFarland 0,5 (~ 10<sup>7</sup> UFC/ml).

**- Milieu**

Gélose chocolat PolyViteX<sup>®</sup> ou Milieu HTM (Mueller Hinton + NAD 15 mg/l + hémine 15 mg/l + extrait de levure 5 g/l).

**- Ensemencement**

- méthode de dilution : déposer 1 à 2 µl de la suspension inoculum, soit ~10<sup>4</sup> UFC par spot.
- méthode de diffusion : diluer au 1/10 la suspension inoculum (~10<sup>6</sup> UFC/ml) et ensemercer par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires.

**- Lecture**

Après 18-24 h d'incubation à 35-37° C.

***Neisseria meningitidis***  
**(tableau XV)**

**- Inoculum**

A partir d'une culture de 18-24 h sur gélose chocolat PolyViteX<sup>®</sup>, préparer une suspension en tampon phosphate M/15 pH 7,2 équivalente au standard McFarland 0,5 (~ 10<sup>6</sup> UFC/ml).

**- Milieu**

Gélose Mueller Hinton

**- Ensemencement**

- méthode de dilution : déposer 10 µl de la suspension inoculum soit ~ 10<sup>4</sup> UFC par spot.
- méthode de diffusion : ensemercer la suspension inoculum par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires. Disposer les disques à une distance de 60 mm, centre à centre, afin d'éviter le chevauchement des zones d'inhibition.

**- Lecture**

Après 18 à 20 h d'incubation à 35-37° C en atmosphère contenant 5 % de CO<sub>2</sub>.

***Neisseria gonorrhoeae***  
**(tableau XVI)**

**- Inoculum**

A partir d'une culture de 18-24 h sur gélose chocolat PolyViteX<sup>®</sup>, préparer une suspension en tampon phosphate M/15 pH 7,2 équivalente au standard McFarland 1 (~10<sup>8</sup> UFC/ml).

**- Milieu**

Gélose chocolat PolyViteX<sup>®</sup>

**- Ensemencement**

- méthode de dilution : déposer 10 µl de la suspension inoculum soit ~ 10<sup>6</sup> UFC par spot.
- méthode de diffusion : ensemercer la suspension inoculum par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires. Disposer les disques à une distance de 60 mm, centre à centre, afin d'éviter le chevauchement des zones d'inhibition.

**- Lecture**

Après 18-24 h d'incubation à 35-37° C en atmosphère contenant 5 % de CO<sub>2</sub>, et, si la croissance est insuffisante, après 36-40 h.

***Campylobacter* spp.**  
**(tableau XVII)**

**- Inoculum**

A partir d'une culture de 18-24 h sur milieux d'isolement, préparer une suspension en bouillon Brucella ou en solution saline (0,9 % NaCl) équivalente au standard McFarland 0,5 (~10<sup>8</sup> UFC/ml).

**- Milieu**

Gélose Mueller Hinton additionnée de 5 % de sang de mouton ou de cheval.

**- Ensemencement**

- méthode de dilution : déposer 2 à 5 µl de la suspension inoculum (~ 10<sup>5</sup> UFC par spot).

- méthode de diffusion : diluer au 1/100 la suspension inoculum puis ensemercer par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires. Sécher la surface des géloses pour éliminer toute trace d'humidité qui favorise l'envahissement.

**- Lecture**

Après 18-24 h d'incubation à 35-37° C en microaérobiose ou en anaérobiose selon l'atmosphère optimale des souches.

***Helicobacter pylori***  
**(tableau XVIII)**

**- Inoculum**

Préparer une suspension en bouillon Mueller Hinton ou en solution saline (0,9 % NaCl) équivalente au standard McFarland 3 (~ 10<sup>9</sup> UFC/ml). Vérifier l'absence de formes coccoïdes (< 10 %).

**- Milieu**

Gélose Mueller Hinton additionnée de 10 % de sang de cheval.

**- Ensemencement**

- méthode de diffusion : ensemercer la suspension inoculum par écouvillonnage ou par inondation en respectant les mesures de sécurité nécessaires.

**- Lecture**

Après 72 h d'incubation à 35-37° C en microaérobiose, et après 4 jours pour détecter les doubles populations.

## **Anaérobies (tableau XIX)**

### **- Inoculum**

A partir d'une culture de 24 h sur gélose Columbia + 5 % de sang de mouton, ou gélose Brucella + vitamine K1 (1 mg/L) + 5 % de sang de mouton laqué, préparer une suspension en bouillon Brucella ou Schaedler équivalente au standard McFarland 0,5 pour la méthode de dilution ( $\sim 10^7$  UFC/ml) ou McFarland 1 ( $\sim 10^8$  UFC/ml) pour la méthode de diffusion. Les bouillons doivent être régénérés avant emploi.

Pour certaines espèces à croissance lente (> 72 heures), préparer une suspension en bouillon Brucella ou Schaedler équivalente au standard McFarland 0,5 à partir d'une culture en bouillon.

### **- Milieu**

Gélose Wilkins Chalgren + 5 % de sang de mouton, ou gélose Brucella + vitamine K1 (1 mg/L) + 5 % de sang de mouton laqué. Pour certaines espèces, d'autres suppléments (bicarbonate de sodium 1 mg/L, hémine 5 mg/L) sont utilisés.

### **- Ensemencement**

- méthode de dilution : déposer 2 à 3  $\mu$ l de la suspension inoculum (McFarland 0,5), soit  $\sim 10^5$  UFC par spot.
- méthode de diffusion : ensemencer la suspension inoculum (McFarland 1) par écouvillonnage.

### **- Lecture**

Après 48 h d'incubation à 35-37° C en atmosphère anaérobie (chambre ou jarre), si la croissance est suffisante. Pour la clindamycine, le test doit être lu impérativement après 48 h d'incubation.

CONTROLE DE QUALITE INTERNE (Révision 2000)

Un contrôle de qualité interne doit être organisé pour s'assurer de la validité des résultats obtenus. Les souches de référence recommandées sont les suivantes :

- *Escherichia coli* ATCC 25922 (CIP 7624),
- *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 27853 (CIP 76110),
- *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 (CIP 7625),

La fréquence des contrôles et les mesures à prendre en cas d'écart par rapport au résultat attendu sont à déterminer en fonction de la méthode utilisée et du nombre de tests réalisés. Le tableau II rassemble les limites acceptables (moyennes  $\pm$  1 écart-type calculés sur 400 tests) des diamètres d'inhibition obtenus par diffusion en milieu gélosé pour ces souches de référence.

**Tableau II** - Limites acceptables des diamètres d'inhibition obtenus par diffusion en milieu gélosé pour les souches de référence recommandées pour les contrôles de qualité.

Antibiotique	Charge du disque	<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923
Pénicilline G	6 µg (10 UI)	-	-	31,0 – 38,5
Oxacilline	5 µg	-	-	27,0 – 34,0
Amoxicilline	25 µg	22,0 – 26,5	-	-
Amoxicilline/ac. clavulanique	20/10 µg	22,0 – 27,0	-	-
Ticarcilline	75 µg	-	25,0 – 30,5	-
Pipéracilline	75 µg	-	27,5 – 32,5	-
Céfalotine	30 µg	18,0 – 23,0	-	-
Céfotaxime	30 µg	32,5 – 37,5	-	-
Ceftazidime	30 µg	-	25,5 – 31,5	-
Imipénème	10 µg	-	24,5 – 29,5	-
Gentamicine	15 µg (10 UI)	22,0 – 26,5	15,5 – 22,5	24,0 – 28,5
Tobramycine	10 µg	-	20,5 – 26,5	-
Amikacine	30 µg	21,5 – 26,0	20,0 – 26,0	-
Acide nalidixique	30 µg	25,5 – 30,5	-	-
Péfloxacine	5 µg	29,0 – 35,5	-	25,5 – 29,5
Ciprofloxacine	5 µg	31,0 – 38,0	29,0 – 36,5	-
Triméthoprim/sulfaméthoxazole (cotrimoxazole)	1,25/23,75µg	25,5 – 30,5	-	28,0 – 32,5
Erythromycine	15 UI	-	-	26,5 – 31,5
Lincomycine	15 µg	-	-	24,5 – 29,5
Pristinamycine	15 µg	-	-	26,5 – 32,0
Rifampicine	30 µg	-	-	34,0 – 39,0
Acide fusidique	10 µg	-	-	28,5 – 34,5
Fosfomycine	50 µg	-	-	24,0 – 35,0
Colistine	50 µg	-	17,0 – 22,0	-
Vancomycine	30 µg	-	-	17,5 – 20,5
Teicoplanine	30 µg	-	-	17,0 – 20,0



**Tableau III** - Concentrations et diamètres critiques des diverses classes d'antibiotiques applicables aux méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (se reporter aux recommandations pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, tableaux VII à XIX - Pour les antibiotiques indiqués en italique, les données sont provisoires).

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)	
		S	R	S	R
<b>PENICILLINES</b>					
Pénicilline G	6 µg (10 UI)	0,25	> 16	29	< 8
Oxacilline (staphylocoques)	5 µg	2	> 2	20	< 20
Ampicilline	10 µg	4	> 16	19	< 14
Ampicilline/sulbactam	10/10 µg	4/8	> 16/8	19	< 14
Amoxicilline	25 µg	4	> 16	21	< 14
Amoxicilline/ac. clavulanique	20/10 µg	4/2	> 16/2	21	< 14
Mécillinam	10 µg	2	> 8	22	< 18
Ticarcilline	75 µg	16	> 64	22	< 18
Ticarcilline/ac. clavulanique	75/10 µg	16/2	> 64/2	22	< 18
Mezlocilline	75 µg	8	> 32	21	< 16
Azlocilline	75 µg	16	> 64	19	< 13
Pipéracilline					
- entérobactéries	75 µg	8	> 64	20	< 12
- autres bacilles à Gram négatif	75 µg	16	> 64	18	< 12
Pipéracilline/tazobactam					
- entérobactéries	75/10 µg	8/4	> 64/4	21	< 14
- autres bacilles à Gram négatif	75/10 µg	16/4	> 64/4	19	< 14
Sulbactam					
<b>CARBAPENEMES</b>					
Imipénème	10 µg	4	> 8	22	< 17
Méropénème	10 µg	4	> 8	20	< 15
<b>MONOBACTAME</b>					
Aztréonam	30 µg	4	> 32	23	< 17

**Tableau III (suite)** - Concentrations et diamètres critiques des diverses classes d'antibiotiques applicables aux méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (se reporter aux recommandations pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, tableaux VII à XIX - Pour les antibiotiques indiqués en italique, les données sont provisoires).

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)	
		S	R	S	R
<b>CEPHALOSPORINES (Voie parentérale)</b>					
Céfalotine	30 µg	8	> 32	18	< 12
Céfamandole	30 µg	8	> 32	22	< 15
Céfuroxime	30 µg	8	> 32	22	< 15
Céfoxitine	30 µg	8	> 32	22	< 15
Céfotétan	30 µg	4	> 32	23	< 17
Céfotiam	30 µg	4	> 32	22	< 15
Céfopérazone	30 µg	4	> 32	21	< 14
Céfotaxime	30 µg	4	> 32	21	< 15
Ceftizoxime	30 µg	4	> 32	21	< 15
Ceftriaxone	30 µg	4	> 32	21	< 15
Ceftazidime	30 µg	4	> 32	21	< 15
Céfépime	30 µg	4	> 32	21	< 15
Cefpirome	30 µg	4	> 32	21	< 15
Latamoxef	30 µg	4	> 32	23	< 17
Cefsulodine	30 µg	8	> 32	22	< 14
<b>CEPHALOSPORINES (Voie orale)</b>					
Céfadroxil	30 µg	8	> 32	18	< 12
Céfalexine	30 µg	8	> 32	18	< 12
Céfradine	30 µg	8	> 32	18	< 12
Céfaclor	10 µg	2	> 8	22	< 16
Céfatrizine	10 µg	2	> 8	22	< 15
Loracarbef	10 µg	2	> 8	23	< 15
Céfuroxime-axétil	10 µg	1	> 4	26	< 20
Céfotiam-héxétil	10 µg	1	> 2	22	< 19
Céfixime	10 µg	1	> 2	25	< 22
Cefpodoxime-proxétil	10 µg	1	> 2	24	< 21

**Tableau III (suite)** - Concentrations et diamètres critiques des diverses classes d'antibiotiques applicables aux méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (se reporter aux recommandations spécifiques pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, tableaux VII à XIX - Pour les antibiotiques indiqués en italique, les données sont provisoires).

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)	
		S	R	S	R
<b>AMINOGLYCOSIDES</b>					
Streptomycine					
- streptocoques, entérocoques	500 µg	250	> 500	14	< 12
- autres bactéries	10 UI	8	> 16	15	< 13
Gentamicine					
- streptocoques, entérocoques	500 µg	250	> 500	17	< 11
- autres bactéries	15 µg (10 UI)	4	> 8	16	< 14
Sisomicine	10 µg	4	> 8	16	< 14
Nétilmicine	30 µg	4	> 8	19	< 17
Kanamycine					
- streptocoques, entérocoques	1000 µg	250	> 500	14	< 10
- autres bactéries	30 UI	8	> 16	17	< 15
Tobramycine	10 µg	4	> 8	16	< 14
Dibékacine	10 µg	4	> 8	16	14
Amikacine	30 µg	8	> 16	17	15
Isépamicine	30 µg	8	> 16	17	15
Spectinomycine ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> )	100 µg	64	> 64	20	< 20
<b>PHENICOLES</b>					
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19
<b>TETRACYCLINES</b>					
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17
Oxytétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17
Doxycycline	30 UI	4	> 8	19	< 17
Minocycline	30 UI	4	> 8	19	< 17

**Tableau III (suite)** - Concentrations et diamètres critiques des diverses classes d'antibiotiques applicables aux méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (se reporter aux recommandations spécifiques pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, tableaux VII à XIX - Pour les antibiotiques indiqués en italique, les données sont provisoires).

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)	
		S	R	S	R
<b>MACROLIDES</b>					
Erythromycine	15 UI	1	> 4	22	< 17
Dirithromycine	15 µg	0,12	> 4	28	< 16
<i>Télithromycine</i>	<i>15 µg</i>	<i>≤ 0,5</i>	<i>&gt; 2</i>	<i>≥ 21</i>	<i>&lt; 17</i>
Azithromycine	15 µg	0,5	> 4	22	< 17
Spiramycine	100 µg	1	> 4	24	< 19
<b>LINCOSAMIDES</b>					
Lincomycine	15 µg	2	> 8	21	< 17
Clindamycine	2 UI	2	> 2	15	< 15
<b>STREPTOGRAMINES</b>					
Pristinamycine	15 µg	1	> 2	22	< 19
Virginiamycine	15 µg	1	> 2	22	< 19
Dalfopristine-quinupristine	15 µg	0,5	> 2	25	< 19
<b>GLYCOPEPTIDES</b>					
Teicoplanine	30 µg	4	> 16	17	-
Vancomycine	30 µg	4	> 16	17	-
<b>POLYPEPTIDES</b>					
Bacitracine	130 µg	2	> 2	15	< 15
Colistine	50 µg	2	> 2	15	< 15
<b>SULFAMIDES - TRIMETHOPRIME</b>					
Sulfamides	200 µg	64	> 256	17	< 12
Triméthoprime	5 µg	4	> 8	16	< 12
Triméthoprime/sulfaméthoxazole (cotrimoxazole)	1,25/23,75µg	2/38	> 8/152	16	< 10
<b>NITROFURANES</b>					
	300 µg	32	> 128	17	< 14

**Tableau III (suite)** - Concentrations et diamètres critiques des diverses classes d'antibiotiques applicables aux méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (se reporter aux recommandations pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, tableaux VII à XIX - Pour les antibiotiques indiqués en italique, les données sont provisoires).

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)	
		S	R	S	R
<b>QUINOLONONES</b>					
Acide oxolinique	10 µg	2	> 4	20	< 17
Fluméquine	30 µg	4	> 8	25	< 21
Acide nalidixique	30 µg	8	> 16	20	< 15
Acide pipémidique	20 µg	8	> 16	19	< 14
Acide piromidique	25 µg	16	> 32	20	< 16
Rosoxacine ( <i>Neisseria gonorrhoeae</i> )	5 µg	1	> 1	-	-
<b>FLUOROQUINOLONONES</b>					
Norfloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19
Loméfloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19
Enoxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19
Péfloxacine	5 µg	1	> 4	22	< 16
Ofloxacine	5 µg	1	> 4	22	< 16
Ciprofloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19
Sparfloxacine	5 µg	1	> 2	20	< 16
Trovafloxacine	10 µg	1	> 2	20	< 17
Lévofloxacine					
- <i>Streptococcus pneumoniae</i>	5 µg	2	> 4	17	< 15
- autres bactéries	5 µg	1	> 4	20	< 15
<i>Moxifloxacine</i>	5 µg	≤ 1	> 2	≥ 21	< 18

**Tableau III (suite)** - Concentrations et diamètres critiques des diverses classes d'antibiotiques applicables aux méthodes de dilution et de diffusion en milieu gélosé (se reporter aux recommandations spécifiques pour certaines espèces ou certains groupes bactériens, tableaux VII à XIX - Pour les antibiotiques indiqués en italique, les données sont provisoires).

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)	
		S	R	S	R
<b>DIVERS</b>					
Rifampicine					
- staphylocoques	30 µg	0,5	> 16	29	< 14
- autres bactéries	30 µg	4	> 16	19	< 14
Fosfomycine	50 µg	32	> 32	14	< 14
Acide fusidique	10 µg	2	> 16	22	< 15
Métronidazole	Comprimé 16 µg	4	> 16	-	< 21
Nitroxoline	20 µg	1	> 32	30	< 12

## RESISTANCES NATURELLES AUX ANTIBIOTIQUES DES PRINCIPALES ESPECES BACTERIENNES D'INTERET MEDICAL

La résistance naturelle est caractéristique d'une espèce bactérienne. Elle délimite le spectre naturel de l'antibiotique et constitue une aide à l'identification. La résistance naturelle se traduit par des CMI supérieures à la valeur critique basse de concentration (c) de l'antibiotique concerné. Pour certains genres ou certaines espèces, la résistance naturelle (signalée par un astérisque) peut s'exprimer faiblement et se traduire par des CMI proches de cette valeur critique basse. Cette résistance naturelle doit aussi être prise en compte pour la lecture interprétative.

### **Bacilles non exigeants à Gram négatif**

Pénicilline G, oxacilline, macrolides, lincosamides, streptogramines, acide fusidique, vancomycine, teicoplanine.

### Entérobactéries

**Tableau IV – Résistances naturelles chez différentes espèces d'entérobactéries.**

Espèce	AM	AMC	TIC	C1G	FOX	CTT	MA	CXM	GM	TET	COL	FT
<i>Klebsiella spp.</i>	R		R									
<i>C. diversus</i>	R		R									
<i>C. freundii</i>	R	R		R	R	R						
<i>E. cloacae</i>	R	R		R	R	R						
<i>E. aerogenes</i>	R	R		R	R	R						
<i>S. marcescens</i>	R	R		R			R	R			R	
<i>P. mirabilis</i>										R	R	R
<i>P. vulgaris</i>	R			R			R	R			R	R
<i>M. organii</i>	R	R		R				R			R	R
<i>P. stuartii</i>	R	R		R					R*		R	R
<i>Y. enterocolitica</i>	R	R	R	R	R		R	R				

R : résistance naturelle

R\* : résistance naturelle s'exprimant faiblement

AM : aminopénicillines ; AMC : amoxicilline + acide clavulanique ; TIC : ticarcilline ;

C1G : céphalosporines de 1<sup>ère</sup> génération ; FOX : céfoxitine ; CTT : céfotétan ; MA : céfamandole ; CXM : céfuroxime ;

GM : gentamicine ; TET : tétracyclines ; COL : colistine, polymyxine B ; FT : nitrofuranes.

## Bacilles à Gram négatif non fermentaires

*Pseudomonas aeruginosa* : aminopénicillines, céphalosporines 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> génération, céfotaxime, ceftriaxone, ceftizoxime, kanamycine, tétracyclines, chloramphénicol, triméthoprim, quinolones.

*Acinetobacter baumannii*, *Acinetobacter calcoaceticus* : aminopénicillines, céphalosporines 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> génération, fosfomycine, triméthoprim, furanes.

Autres bacilles à Gram négatif non fermentaires : aminopénicillines, céphalosporines 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> génération. Voir aussi le tableau V.

**Tableau V – Résistances naturelles chez différentes espèces de bacilles à Gram négatif non fermentaires.**

Espèce	TIC	TCC	PIP	CTX	CAZ	IPM	QUI	C	TMP	FOS	COL
<i>S. maltophilia</i>	R		R	R		R			R	R	
<i>B. cepacia</i>	R	R				R	R	R	R	R	R
<i>A. denitrificans</i>				R							
<i>C. meningosepticum</i>	R	R	R	R	R	R	R				R
<i>O. anthropi</i>	R	R	R	R	R						

R : résistance naturelle

TIC : ticarcilline ; TCC : ticarcilline + ac. clavulanique ; PIP: pipéracilline ; CTX: céfotaxime ; CAZ : ceftazidime ;

IPM : imipénème ; QUI : quinolones ; C : chloramphénicol ; TMP: triméthoprim ; FOS : fosfomycine ;

COL : colistine, polymyxine B.

## *Aeromonas*

aminopénicillines (sauf *Aeromonas rota*), céphalosporines de 1<sup>ère</sup> et de 2<sup>ème</sup> génération (sauf *Aeromonas veronii*).



### **Bacilles exigeants à Gram négatif**

*Haemophilus* : macrolides (cycle à 16 atomes : spiramycine, josamycine, midécamycine), lincosamides.

*Campylobacter* : aztréonam, novobiocine, streptogramines, triméthoprimé, vancomycine, teicoplanine.

*Campylobacter jejuni* , *Campylobacter coli* et *Campylobacter lari* : céphalosporines de 1<sup>re</sup> génération.

*Campylobacter fetus* et *Campylobacter lari* : quinolones.

### **Coques à Gram positif**

mécilline, aztréonam, quinolones, colistine.

*Staphylococcus saprophyticus* : fosfomycine, novobiocine.

*Staphylococcus cohnii*, et *Staphylococcus xylosus* : novobiocine, lincomycine.

*Micrococcus* : furanes.

*Streptococcus* (dont *Streptococcus pneumoniae*) : aminoglycosides (bas niveau), péfloxaciné.

*Enterococcus* : oxacilline, céphalosporines, aminoglycosides (bas niveau), péfloxaciné, fosfomycine (bas niveau), sulfamides.

*Enterococcus faecalis* : lincosamides.

*Enterococcus gallinarum* - *Enterococcus casseliflavus* : glycopeptides \*.

*Pediococcus* – *Leuconostoc* : vancomycine, teicoplanine.

### **Bacilles à Gram positif**

mécilline, aztréonam, colistine, polymyxine B, quinolones.

*Listeria monocytogenes* : oxacilline, céphalosporines, lincosamides, fosfomycine, fluoroquinolones (bas niveau).

*Erysipelothrix rhusiopathiae* : vancomycine, teicoplanine.

*Corynebacterium urealyticum* - *Corynebacterium jeikeium* : -lactamines, aminoglycosides, macrolides, lincosamides, sulfamides.

*Rhodococcus equi* : streptogramines, lincosamides.

*Bacillus cereus* : pénicilline G, amino- et carboxy- pénicillines, céphalosporines.

*Nocardia asteroides* – *Nocardia farcinica* : triméthoprimé, vancomycine, rifampicine, fluoroquinolones.

*Lactobacillus* : sulfamides.

*Lactobacillus* hétérofermentaires : vancomycine, teicoplanine.

### **Coques à Gram négatif**

*Neisseria* : triméthoprimé, vancomycine, teicoplanine ;

*Neisseria meningitidis* - *Neisseria gonorrhoeae* : lincosamides, colistine, polymyxine B.

*Branhamella catarrhalis* : lincosamides, triméthoprimé.

*Moraxella* : triméthoprimé.

### **Bactéries anaérobies strictes**

aminoglycosides, aztréonam (sauf *Fusobacterium*), triméthoprimé, quinolones.

*Bacteroides* du groupe *fragilis* : aminopénicillines, céphalosporines 1<sup>ere</sup> génération, céfamandole, céfuroxime, colistine, polymyxine B, vancomycine, teicoplanine, fosfomycine.

*Prevotella* : vancomycine, teicoplanine, fosfomycine.

*Porphyromonas* : fosfomycine, colistine, polymyxine B.

*Fusobacterium* : macrolides (bas niveau) .

*Fusobacterium varium* - *Fusobacterium mortiferum* : rifampicine.

*Clostridium* - *Eubacterium* – *Peptostreptococcus* : colistine, polymyxine B, fosfomycine

*Clostridium difficile* : céphalosporines.

*Clostridium innocuum* : vancomycine (bas niveau).

*Actinomyces* – *Propionibacterium* : céphalosporines 1<sup>ere</sup> génération, métronidazole, ornidazole.

*Mobiluncus* : métronidazole.

*Veillonella* : macrolides (bas niveau), glycopeptides.

## ANTIBIOTIQUES A TESTER PAR ESPECE OU GROUPE BACTERIEN

Le tableau VI indique les antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien. Chaque molécule (ou son équivalent) est représentative d'une classe d'antibiotiques. Deux listes distinctes (ne préjugant pas de la technique à mettre en œuvre) sont présentées :

### *Liste standard*

Cette liste comprend les antibiotiques nécessaires à l'orientation thérapeutique, en fonction des indications cliniques et de la prévalence de la résistance acquise.

### *Liste complémentaire*

Cette liste comprend les antibiotiques plus spécifiquement utilisés pour l'étude des souches multirésistantes, la surveillance épidémiologique de la résistance ou l'aide à l'interprétation des résultats de l'antibiogramme.

Il n'est pas utile de tester en routine d'autres molécules que celles mentionnées dans les listes standard et complémentaire par espèce ou groupe bactérien mais le choix des antibiotiques de la liste standard peut être adapté par chaque laboratoire en fonction des schémas thérapeutiques de première intention retenus par le Comité du Médicament, ou de données épidémiologiques locales.

**Tableau VI — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

Liste standard	
<i>Enterobacteriaceae</i> <sup>1</sup>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <sup>2</sup>
Amoxicilline ou ampicilline	Ticarcilline (H)
Amoxicilline/ac. clavulanique ou ampicilline/sulbactam	Pipéracilline (H)
Mécillinam	Ceftazidime (H)
Céfalotine (H)	Imipénème (H)
Ceftriaxone ou céfotaxime (H) ou ceftizoxime (H)	Gentamicine Tobramycine Amikacine (H)
Cefixime	Ciprofloxacine
Gentamicine Amikacine (H)	Colistine
Acide nalidixique Norfloxacine Ciprofloxacine	
Cotrimoxazole	
Nitrofuranes	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

1 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau VII

2 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau VIII

Liste complémentaire	
<i>Enterobacteriaceae</i> <sup>1</sup>	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> <sup>2</sup>
Ticarcilline (H)	Ticarcilline/ac. clavulanique (H)
Ticarcilline/ac. clavulanique (H)	Pipéracilline/tazobactam (H)
Mezlocilline (H) ou pipéracilline (H)	Céfépime (H) ou ceftirome (H)
Pipéracilline/tazobactam (H)	
Céfamandole	Cefsulodine (H)
Céfuroxime (H)	Aztréonam (H)
Céfoxitine (H)	Nétilmicine
Céfotétan (H)	Isépamicine (H)
Latamoxef	
Ceftazidime (H)	Péfloxacine ou ofloxacine
Céfépime (H) ou ceftirome (H)	
Aztréonam (H)	
Imipénème (H)	
Kanamycine	Sulfamides
Tobramycine	
Nétilmicine	
Isépamicine (H)	
Chloramphénicol	Fosfomycine (H)
Tétracycline	
Minocycline	
Péfloxacine ou ofloxacine	
Sulfamides	
Triméthoprim	
Colistine	
Fosfomycine (H)	

**Tableau VI (suite) — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

<b>Autres bacilles à Gram négatif non fermentaires<sup>3</sup></b>			
Liste standard commune aux 3 espèces	Liste standard spécifique		
	<i>Acinetobacter spp.</i>	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Burkholderia cepacia</i>
Ticarcilline (H) Ticarcilline/ac. clavulanique (H) Pipéracilline (H) Pipéracilline/tazobactam (H) Ceftazidime (H) Imipénème (H)	Ticarcilline (H) ou ticarcilline/ac. clavulanique (H) Pipéracilline (H) ou pipéracilline/tazobactam (H) Ceftazidime (H) Imipénème (H)	Ticarcilline/ac. clavulanique (H)  Cotrimoxazole  Ciprofloxacine	Pipéracilline (H)  Ceftazidime (H)  Imipénème (H)
Gentamicine Tobramycine Amikacine (H)	Gentamicine Tobramycine Amikacine (H)		Cotrimoxazole  Ciprofloxacine
Cotrimoxazole Ciprofloxacine	Péfloxacin ou ofloxacine ou ciprofloxacine		

<b>Autres bacilles à Gram négatif non fermentaires<sup>3</sup></b>			
Liste complémentaire commune aux 3 espèces	Liste complémentaire spécifique		
	<i>Acinetobacter spp.</i>	<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	<i>Burkholderia cepacia</i>
Sulbactam (H) Céfépime (H) Cefpirome (H) Sulbactam (H) + ceftazidime (H) ou sulbactam (H) + céfépime (H) ou sulbactam (H) + cefpirome (H) Méropénème (H)	Sulbactam (H) Céfépime (H) Cefpirome (H) Sulbactam (H) + ceftazidime (H) ou sulbactam (H) + céfépime (H) ou sulbactam (H) + cefpirome (H)	Ceftazidime (H)  Imipénème (H)  Chloramphénicol  Tétracycline  Rifampicine	Sulbactam (H)   Chloramphénicol  Tétracycline  Colistine <sup>4</sup>
Nétilmicine Isépamicine (H)	Nétilmicine Isépamicine (H)		
Chloramphénicol Tétracycline Colistine Rifampicine	Cotrimoxazole  Rifampicine		

(H) - antibiotique distribué en milieu hospitalier

3 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau IX

4 – aide à l'identification (résistance naturelle)

**Tableau VI (suite) — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

Liste standard	
<i>Staphylococcus spp.</i> <sup>5</sup>	<i>Enterococcus spp.</i> <sup>6</sup>
Pénicilline G	Ampicilline
Oxacilline	Gentamicine
Gentamicine	Nitrofuranes
Erythromycine Lincomycine	
Pristinamycine	
Péfloxacine ou ofloxacine ou ciprofloxacine	
Acide fusidique	
Cotrimoxazole	
Rifampicine	
Fosfomycine (H)	
Vancomycine (H) Teicoplanine (H)	

(H) - antibiotique distribué en milieu hospitalier

5 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau X

6 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XI

Liste complémentaire	
<i>Staphylococcus spp.</i> <sup>5</sup>	<i>Enterococcus spp.</i> <sup>6</sup>
Streptomycine Kanamycine Tobramycine	Oxacilline
Sulfamides Triméthoprim	Streptomycine Kanamycine
Chloramphénicol	Chloramphénicol
Tétracycline Minocycline	Tétracycline
Nitrofuranes	Erythromycine Lincomycine <sup>9</sup> ou clindamycine <sup>9</sup>
Novobiocine <sup>7</sup> O/129 <sup>8</sup>	Pristinamycine
	Cotrimoxazole
	Rifampicine
	Fluoroquinolones <sup>6</sup>
	Vancomycine (H) Teicoplanine (H)

7 – aide à l'identification de *S. saprophyticus*, *S. xylosus* et *S. cohnii* (résistance naturelle)

8 - pour la différenciation entre staphylocoques (R) et microcoques (S)

9 – aide à l'identification de *E. faecalis* (résistance naturelle)

**Tableau VI (suite) — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

Liste standard	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> <sup>10</sup>	<i>Streptococcus spp.</i> <sup>11</sup> (autres que <i>S. pneumoniae</i> )
Pénicilline G	Pénicilline G
Ampicilline ou amoxicilline	Ampicilline ou amoxicilline
Oxacilline	Tétracycline
Céfotaxime (H) ou ceftriaxone	Erythromycine Lincomycine ou clindamycine
Tétracycline	Pristinamycine
Erythromycine Lincomycine ou clindamycine	
Pristinamycine	

(H) - antibiotique distribué en milieu hospitalier

10 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XII

11 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XIII

Liste complémentaire	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> <sup>10</sup>	<i>Streptococcus spp.</i> <sup>11</sup> (autres que <i>S. pneumoniae</i> )
Imipénème (H)	Streptomycine Kanamycine Gentamicine
Streptomycine Kanamycine Gentamicine	Chloramphénicol
Chloramphénicol	Spiramycine
Cotrimoxazole <sup>12</sup>	Cotrimoxazole <sup>12</sup>
Fluoroquinolones <sup>10</sup>	Fluoroquinolones <sup>11</sup>
Fosfomycine (H)	Rifampicine
Vancomycine (H) Teicoplanine (H)	Vancomycine (H) Teicoplanine (H)

12 – tester sur milieu de Mueller-Hinton additionné de 5% de sang de cheval hémolysé

**Tableau VI (suite) — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

Liste standard		
<i>Haemophilus spp.</i> <sup>13</sup>	<i>Neisseria meningitidis</i> <sup>14</sup>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> <sup>15</sup>
Ampicilline <sup>16</sup>	Pénicilline G (oxacilline) ou amoxicilline	Pénicilline G <sup>16</sup> (oxacilline) ou amoxicilline <sup>16</sup>
Amoxicilline/ac. clavulanique	Chloramphénicol	Spectinomycine
Céfalotine	Rifampicine	Tétracycline
Tétracycline		Acide nalidixique
Cotrimoxazole		

Liste complémentaire		
<i>Haemophilus spp.</i> <sup>13</sup>	<i>Neisseria meningitidis</i> <sup>14</sup>	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> <sup>15</sup>
Chloramphénicol	Céfotaxime (H) ou ceftriaxone	Ceftriaxone
Rifampicine		Chloramphénicol
Kanamycine		Erythromycine
Gentamicine		Ciprofloxacine ou ofloxacine
Fluoroquinolones		

(H) - antibiotique distribué en milieu hospitalier

13 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XIV

14 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XV

15 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XVI

16 – la résistance aux pénicillines par production de  $\beta$ -lactamases est déterminée dès l'isolement par une technique chromogénique

**Tableau VI (suite) — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

Liste standard	
<i>Campylobacter spp.</i> <sup>17</sup>	<i>Helicobacter pylori</i> <sup>18</sup>
Ampicilline Amoxicilline/ac. clavulanique Imipénème (H)	Erythromycine
Gentamicine	
Erythromycine	
Ciprofloxacine	
Tétracycline	

Liste complémentaire	
<i>Campylobacter spp.</i> <sup>17</sup>	<i>Helicobacter pylori</i> <sup>18</sup>
Céfalotine (H) <sup>19</sup> Céfotaxime (H)	
Streptomycine Kanamycine	
Acide nalidixique <sup>19</sup>	
Chloramphénicol	

(H) - antibiotique distribué en milieu hospitalier

17 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XVII

18 – Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XVIII

19 – Aide à l'identification



**Tableau VI (suite) — Antibiotiques à tester par espèce ou groupe bactérien.**

Liste standard
<b>Anaérobies stricts</b> <sup>20</sup>
Amoxicilline Amoxicilline/ac. clavulanique
Imipénème (H)
Clindamycine
Métronidazole
Vancomycine (H)
Chloramphénicol

Liste complémentaire
<b>Anaérobies stricts</b> <sup>20</sup>
Ticarcilline (H) ou pipéracilline (H)
Ticarcilline/ac. clavulanique (H) ou pipéracilline/tazobactam (H)
Céfoxitine (H) Céfotétan (H) Céfotaxime (H)
Pristinamycine
Spiramycine <sup>21</sup>
Colistine <sup>22</sup>
Ofloxacin <sup>23</sup>
Rifampicine

(H) - antibiotique distribué en milieu hospitalier

20 - Pour l'interprétation des tests et la réalisation de certains : cf. tableau XIX

21 - En cas d'infection dentaire

22 - Aide à l'identification des bacilles à Gram négatif

23 - Pour les *Propionibacterium* spp. et quelques souches de *Peptostreptococcus* spp. isolées d'infection sévère (osseuse ou cérébrale).

**Tableau VII – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Enterobacteriaceae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Ampicilline	10 µg	4	> 16	19	< 14	Interprétation valable pour bacampicilline, métampicilline, pivampicilline. Cf. règles (1) et (2). Cf. règles (1) et (2).
Amoxicilline	25 µg	4	> 16	21	< 14	
Ampicilline/sulbactam	10/10 µg	4/8	> 16/8	19	< 14	Cf. règle (1b).
Amoxicilline/ac. clavulanique	20/10 µg	4/2	> 16/2	21	< 14	Cf. règle (1b).
Ticarilline (H)	75 µg	16	64	22	< 18	Interprétation valable pour un traitement intraveineux. Cf. règles (1), (2) et (3).
Ticarilline/ac. clavulanique (H)	75/10 µg	16/2	> 64/2	22	< 18	Cf. règles (1), (2) et (3).
Mezlocilline (H)	75 µg	8	> 32	21	< 16	
Pipéracilline (H)	75 µg	8	> 64	20	< 12	Interprétation valable pour un traitement intraveineux. Cf. règles (1), (2) et (3).
Pipéracilline/tazobactam (H)	75/10 µg	8/4	> 64/4	21	< 14	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Mécillinam	10 µg	2	> 8	22	< 18	
Imipénème (H)	10 µg	4	> 8	22	< 17	Cf. règles (4) et (5).
Aztréonam (H)	30 µg	4	> 32	23	< 17	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

#### Règles de lecture interprétative

(1) Interpréter I les résultats S (faible expression de la résistance naturelle) dans les cas suivants :

a – *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella oxytoca*, *Citrobacter diversus* et *Escherichia hermannii*, S aux amino- et/ou aux carboxy- et/ou aux uréido-pénicillines.

b – *Enterobacter cloacae*, *Enterobacter aerogenes*, *Citrobacter freundii*, *Serratia marcescens*, *Morganella morganii*, *Providencia rettgeri*, *Providencia stuartii* et *Hafnia alvei*, S aux amino-pénicillines et/ou aux céphalosporines de première génération et/ou à l'association amoxicilline + acide clavulanique et ampicilline + sulbactam.

c – *Proteus vulgaris* et *Proteus penneri*, S aux amino-pénicillines et/ou aux céphalosporines de première génération.

(2) Interpréter I un résultat S aux carboxy- et/ou aux uréido-pénicillines chez *Proteus mirabilis* R aux amino-pénicillines.

(3) Interpréter I un résultat S aux uréido-pénicillines chez toute entérobactérie I ou R aux carboxy-pénicillines.

**Tableau VII (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Enterobacteriaceae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques	
		S	R	S	R		
Céfalotine (H)	30 µg	8	> 32	18	< 12	Interprétation valable pour les céphèmes injectables de 1 <sup>ère</sup> génération (céfapirine, céfazoline). Interprétation également valable pour les céphèmes oraux de 1 <sup>ère</sup> génération (céfadroxil, céfalexine, céfradine, céfclor, cefatrizine, loracarbef) mais uniquement pour les souches isolées des urines.	
Céfuroxime (H)	30 µg	8	> 32	22	< 15	Non commercialisé en France  Pour ce groupe de molécules cf. règles (4) et (5)	
Céfamandole	30 µg	8	> 32	22	< 15		
Céfoxitine (H)	30 µg	8	> 32	22	< 15		
Céfotétan (H)	30 µg	4	> 32	23	< 17		
Latamoxef	30 µg	4	> 32	23	< 17		
Céfotaxime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15		
Ceftizoxime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15		
Ceftriaxone	30 µg	4	> 32	21	< 15		
Ceftazidime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15		
Céfépime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15		
Cefpirome (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15		
Céfixime	10 µg	1	> 2	25	< 22		Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

#### Règles de lecture interprétative (suite)

- (4) Interpréter I un résultat S à céfotaxime et/ou à ceftriaxone et/ou à ceftazidime et/ou à aztréonam si le résultat est I ou R à l'une des molécules citées chez une entérobactérie naturellement productrice d'une céphalosporinase inducible (*Enterobacter cloacae*, *Citrobacter freundii*, etc).
- (5) La mise en évidence d'une synergie entre un inhibiteur de  $\beta$ -lactamase et les céphalosporines de 3<sup>e</sup> génération et/ou l'aztréonam permet la détection de mécanismes de résistance non décelables par les tests usuels. En pratique, on réalise le test de synergie en disposant les disques des  $\beta$ -lactamines à étudier à 30 mm (centre à centre) d'un disque d'amoxicilline + acide clavulanique (AMC).
- a – Une synergie entre AMC et la ceftazidime et/ou l'aztréonam (indicateurs les plus sensibles) et/ou le céfotaxime et/ou la ceftriaxone permet la détection d'une  $\beta$ -lactamase à spectre étendu (BLSE). La détection de BLSE chez les souches également hyperproductrices de céphalosporinase (*Enterobacter*, par exemple) est facilitée par la recherche d'une synergie entre AMC et céfépime ou cefpirome. Chez *P. mirabilis*, *P. vulgaris*, *P. penneri*, *M. morgani*, *P. stuartii* et *P. rettgeri*, les BLSE s'expriment à bas niveau. Dans ce cas, le test de synergie est optimisé en disposant les disques à une distance de 40-45 mm au lieu de 30 mm. En cas de synergie, interpréter I tout résultat S obtenu pour céfotaxime, ceftriaxone, ceftizoxime, ceftazidime, céfépime, cefpirome, céfixime et pour l'aztréonam. Etant donné l'épidémiologie actuelle, quand une entérobactérie est R à la tobramycine, la nétilmicine et l'amikacine, mais S à la gentamicine, il est conseillé de rechercher la présence d'une BLSE associée, surtout chez les espèces où ce type d'enzyme est faiblement exprimé (*Proteus spp.*, *Providencia spp.*).
- b – Chez *K. oxytoca*, un test de synergie positif avec l'aztréonam et/ou la ceftriaxone, mais négatif avec la ceftazidime dont l'activité est conservée, évoque une hyperproduction de la  $\beta$ -lactamase naturelle chromosomique. Interpréter I les seuls résultats S associés à une synergie.
- c - Chez *P. vulgaris*, *P. penneri* et *C. diversus*, un test de synergie positif avec le céfotaxime et/ou l'aztréonam évoque une hyperproduction de la  $\beta$ -lactamase naturelle chromosomique et beaucoup plus rarement la présence d'une BLSE plasmidique.

**Tableau VII (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Enterobacteriaceae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Kanamycine	30 UI	8	16	17	< 15	Interprétation valable pour néomycine, framycétine, paromomycine.
Tobramycine	10 µg	4	> 8	16	< 14	Cf. règles (6), (9) et (11).
Amikacine (H)	30 µg	8	> 16	17	< 15	Cf. règles (6) et (7).
Isépamicine (H)	30 µg	8	> 16	17	< 15	Cf. règles (6) et (7).
Gentamicine	15 µg (10 UI)	4	> 8	16	< 14	Cf. règles (6), (8) et (11)
Nétilmicine	30 µg	4	> 8	19	< 17	Cf. règles (6), (10) et (11)

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

#### Règles de lecture interprétative (suite)

Abréviations : gentamicine (G), tobramycine (T), nétilmicine (Nt), amikacine (A), isépamicine (Is)

- (6) Se conformer aux diamètres critiques de chaque molécule pour l'interprétation si une diminution des diamètres d'inhibition (< 20 mm) est observée pour l'ensemble des aminosides ; elle évoque une perméabilité diminuée.
- (7) Interpréter A<sup>1</sup>Is<sup>1</sup> un résultat G<sup>S</sup> et T<sup>I/R</sup> Nt<sup>I/R</sup> et A<sup>S/I</sup> I<sup>S</sup>, évoquant la production d'une AAC(6'), (cf. également note 5).
- (8) Interpréter G<sup>I</sup> un résultat G<sup>S</sup> si une diminution du diamètre d'inhibition (16 à 19 mm) de la seule gentamicine, évoquant la production d'une AAC (3)-I, est observée.
- (9) Interpréter T<sup>I</sup> un résultat T<sup>S</sup> si une diminution du diamètre d'inhibition (16 à 19 mm) de la tobramycine est observée avec un résultat G<sup>I/R</sup>. Ceci évoque la production d'une ANT (2'').
- (10) Interpréter Nt<sup>I</sup> un résultat Nt<sup>S</sup> si une diminution du diamètre d'inhibition (19 à 22 mm) de la nétilmicine est observée avec un résultat G<sup>I/R</sup> T<sup>I/R</sup>. Ceci évoque la production d'une AAC(3)-II ou d'une AAC(3)-IV.
- (11) Chez *Providencia spp.*, après vérification de l'identification, interpréter G<sup>I</sup> T<sup>I</sup> Nt<sup>I</sup> un résultat G<sup>S</sup> T<sup>S</sup> et Nt<sup>S</sup> (résistance naturelle par production d'une AAC (2')-I).

**IMPORTANT** : Les phénotypes G<sup>R</sup> T<sup>S</sup> Nt<sup>R</sup> A<sup>S</sup>, G<sup>S</sup> T<sup>R</sup> Nt<sup>R</sup> A<sup>S</sup>, G<sup>S</sup> T<sup>S</sup> Nt<sup>R</sup> A<sup>R</sup> et G<sup>S</sup> T<sup>R</sup> Nt<sup>S</sup> A<sup>R</sup> demeurent improbables. Vérifier l'identification et l'antibiogramme, ainsi que l'interprétation.

**Tableau VII (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Enterobacteriaceae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Interprétation valable pour oxytétracycline et doxycycline.
Minocycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	
Colistine	50 µg	2	> 2	15	< 15	Interprétation valable pour polymyxine B. Résistance naturelle de <i>Proteus</i> spp., <i>Providencia</i> spp., <i>Morganella</i> spp. et <i>Serratia</i> spp..
Sulfamides	200 µg	64	> 256	17	< 12	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Triméthoprim	5 µg	4	> 8	16	< 12	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Triméthoprim/sulfaméthoxazole	1,25/23,75 µg	2/38	> 8/152	16	< 10	Interprétation valable pour les autres associations triméthoprim-sulfamide.
Nitrofuranes	300 µg	32	> 128	17	< 14	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Acide oxolinique	10 µg	2	> 4	20	< 17	Il est justifié de fournir une réponse globale pour l'ensemble du groupe des quinolones classiques (parfois appelées de première génération) en n'étudiant qu'un seul représentant de ce groupe. Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Fluméquine	30 µg	4	> 8	25	< 21	
Acide nalidixique	30 µg	8	> 16	20	< 15	
Acide pipémidique	20 µg	8	> 16	19	< 14	
Acide piromidique	25 µg	16	> 32	20	< 16	
Norfloxacin	5 µg	1	> 2	22	< 19	La résistance aux fluoroquinolones urinaires est croisée entre les différentes molécules mais son niveau d'expression peut varier pour chaque molécule.
Loméfloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19	
Enoxacin	5 µg	1	> 2	22	< 19	
Péfloxacin	5 µg	1	> 4	22	< 16	La résistance aux fluoroquinolones systémiques est croisée entre les différentes molécules mais son niveau d'expression peut varier pour chaque molécule. Les souches d'entérobactéries sensibles à la péfloxacin (PFX) sont sensibles aux autres fluoroquinolones. Pour les souches I (ou R) à PFX, des différences d'activité intrinsèque impliquent un test et une réponse indépendante pour les autres molécules.
Ofloxacin	5 µg	1	> 4	22	< 16	
Ciprofloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19	
Lévofloxacine	5 µg	1	> 4	20	< 15	
<i>Moxifloxacin</i>	5 µg	≤ 1	> 2	≥ 21	< 18	
Fosfomycine (H)	50 µg	32	> 32	14	< 14	Interprétation valable pour un traitement intraveineux.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau VIII – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Pseudomonas aeruginosa*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentration critique (mg/L)		Diamètre critique (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Ticarcline (H)	75 µg	16	> 64	22	< 18	Cf. règles (1) à (4). L'azlocilline n'est pas commercialisée en France.
Ticarcline/ac. clavulanique (H)	75/10 µg	16/2	> 64/2	22	< 18	
Azlocilline	75 µg	16	> 64	19	< 13	
Pipéracilline (H)	75 µg	8	> 64	20	< 12	
Pipéracilline/tazobactam (H)	75/10 µg	8/4	> 64/4	21	< 14	
Imipénème (H)	10 µg	4	> 8	22	< 17	Une résistance isolée à l'imipénème permet de détecter une imperméabilité sélective par modification de porine. Cette résistance n'est pas croisée avec les autres -lactamines. Le méropénème n'est pas commercialisé en France.
Méropénème (H)	10 µg	4	> 8	20	< 15	
Aztréonam (H)	30 µg	4	> 32	23	< 17	Cf. règles (3) à (5).
Céfopérazone (H)	30 µg	4	> 32	21	< 14	Cf. règles (1) à (5).
Ceftazidime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15	
Cefsulodine (H)	30 µg	8	> 32	22	< 14	
Céfépime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15	
Cefpirome (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

#### Règles de lecture interprétative

Abréviations : TIC, ticarcilline ; TCC, ticarcilline + acide clavulanique ; PIP, pipéracilline ; PTZ, pipéracilline + tazobactam ; AZL, azlocilline ; IPM, imipénème ; ATM, aztréonam ; CFZ, céfopérazone ; CFS, cefsulodine ; CPO, cefpirome ; FEP, céfépime ; CAZ, ceftazidime.

- (1) Interpréter I un résultat S à TCC, PIP, PTZ, AZL, CFZ, CFS si une résistance à haut niveau (CMI > 256 mg/l, disque contact) à TIC est mise en évidence.
- (2) Un résultat TIC<sup>S</sup> TCC<sup>1R</sup> est en relation avec une céphalosporinase inductible ; il n'y a pas lieu de changer la catégorisation de la ticarcilline.
- (3) Interpréter I un résultat S à TIC, TCC, PTZ, CFZ, CFS, CPO, ATM PIP<sup>1R</sup> si un phénotype PIP<sup>1R</sup> CAZ<sup>1R</sup> et TIC<sup>S</sup> est mis en évidence.
- (4) Un résultat TIC<sup>1R</sup> TCC<sup>1R</sup> et/ou ATM<sup>1R</sup> avec une sensibilité conservée aux autres -lactamines du tableau ci-dessus évoque une résistance par efflux. Etant donné l'absence de données sur les conséquences cliniques, il n'y a pas lieu de changer les catégorisations.
- (5) Une synergie entre TCC et ATM et/ou CAZ et/ou FEP et/ou CPO permet la détection de certaines -lactamases à spectre étendu (BLSE).

**Tableau VIII (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Pseudomonas aeruginosa*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentration critique (mg/L)		Diamètre critique (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Tobramycine	10 µg	4	> 8	16	< 14	Cf. règles (6) et (7).
Amikacine (H)	30 µg	8	> 16	17	< 15	
Isépamicine (H)	30 µg	8	> 16	17	< 15	
Gentamicine	15 µg (10 UI)	4	> 8	16	< 14	
Nétilmicine	30 µg	4	> 8	19	< 17	
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Interprétation valable pour les autres tétracyclines, sauf la minocycline.
Minocycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	
Colistine	50 µg	2	> 2	15	< 15	Interprétation valable pour polymyxine B.
Péfloxacine	5 µg	1	> 4	22	< 16	La résistance aux fluoroquinolones systémiques est croisée, mais son niveau d'expression peut varier pour chaque molécule. Pour <i>P. aeruginosa</i> , il est recommandé de tester la ciprofloxacine (CIP) et la péfloxacine (PFX) ou l'ofloxacine (OFX). Les souches PFX <sup>LR</sup> ou OFX <sup>LR</sup> pour lesquelles la CMI de CIP est 1 mg/l (diamètre 22 mm) demeurent sensibles à CIP.
Ofloxacine	5 µg	1	> 4	22	< 16	
Ciprofloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19	
Rifampicine	30 µg	4	> 16	19	< 14	
Fosfomycine (H)	50 µg	32	> 32	14	< 14	
Sulfamides	200 µg	64	> 256	17	< 12	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

#### Règles de lecture interprétative (suite)

Abréviations : G, gentamicine ; T, tobramycine ; Nt, nétilmicine ; A, amikacine ; Is, isépamicine.

(6) - Se conformer aux diamètres critiques de chaque molécule pour l'interprétation, si une diminution des diamètres d'inhibition (< 20 mm), évoquant une résistance non enzymatique, est observée pour l'ensemble des aminoglycosides.

(7) - Interpréter A<sup>1</sup> Is<sup>1</sup> un résultat A<sup>S</sup> Is<sup>S</sup> et G<sup>S</sup> et T<sup>LR</sup> Nt<sup>LR</sup> évoquant la production d'une AAC (6')-1.

**Tableau IX – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Acinetobacter* spp., *Stenotrophomonas maltophilia* et *Burkholderia cepacia*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Ticarcilline (H) Ticarcilline/ac. clavulanique (H)	75 µg 75/10 µg	16 16/2	> 64 > 64/2	22 22	< 18 < 18	Pour <i>Acinetobacter</i> spp. Pour <i>Acinetobacter</i> spp. et <i>S. maltophilia</i> .
Pipéracilline (H) Pipéracilline/tazobactam (H)	75 µg 75/10 µg	16 16/4	> 64 > 64/4	18 19	< 12 < 14	Pour <i>Acinetobacter</i> spp. et <i>B. cepacia</i> . Pour <i>Acinetobacter</i> spp.
Sulbactam (H)		8	-			Activité antibactérienne propre à évaluer par détermination de la CMI pour <i>Acinetobacter</i> spp. et <i>B. cepacia</i> .
Imipénème (H) Méropénème (H)	10 µg 10 µg	4 4	> 8 > 8	22 20	< 17 < 15	
Ceftazidime (H) Céfépime (H) Cefpirome (H)	30 µg 30 µg 30 µg	4 4 4	> 32 > 32 > 32	21 21 21	< 15 < 15 < 15	Synergie possible sulbactam + ceftazidime pour <i>Acinetobacter</i> spp. Synergie possible sulbactam + céfépime pour <i>Acinetobacter</i> spp. Synergie possible sulbactam + cefpirome pour <i>Acinetobacter</i> spp.
Tobramycine Amikacine (H) Isépamicine (H) Gentamicine Nétilmicine	10 µg 30 µg 30 µg 15 µg (10 UI) 30 µg	4 8 8 4 4	> 8 > 16 > 16 > 8 > 8	16 17 17 16 19	< 14 < 15 < 15 < 14 < 17	Pour <i>Acinetobacter</i> spp.
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Pour <i>S. maltophilia</i> et <i>B. cepacia</i> .
Colistine	50 µg	2	> 2	15	< 15	Interprétation valable pour polymyxine B. Résistance naturelle pour <i>B. cepacia</i> .
Péfloxacine Ofloxacine Ciprofloxacine <i>Moxifloxacine</i>	5 µg 5 µg 5 µg 5 µg	1 1 1 ≤ 1	> 4 > 4 > 2 > 2	22 22 22 ≥ 21	< 16 < 16 < 19 < 18	La résistance aux fluoroquinolones systémiques est croisée entre les différentes molécules mais son niveau d'expression peut varier pour chaque molécule.
Rifampicine	30 µg	4	> 16	19	< 14	Pour <i>Acinetobacter</i> spp. et <i>S. maltophilia</i> .
Triméthoprim/sulfaméthoxazole	1,25/23,75 µg	2/38	> 8/152	16	< 10	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier



**Tableau X – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Staphylococcus* spp..**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Pénicilline G	6 µg (10 UI)	0,25	> 16	29	< 8	Interprétation valable pour la pénicilline G et la phénoxy-méthyl-pénicilline. Les souches productrices de pénicillinase sont résistantes à la pénicilline G (diamètre < 29 mm; CMI > 0,25 mg/l) et autres pénicillines hydrolysables (amino-, carboxy- et uréido-pénicillines). Seule la pénicilline G doit être testée. Lorsque le diamètre est 29 mm, vérifier l'absence de production de pénicillinase par une technique chromogénique.
Oxacilline	5 µg	2	> 2	20	< 20	La résistance des staphylocoques aux isoxazolyl-pénicillines (oxacilline, cloxacilline), molécules stables aux pénicillinases, doit être recherchée à l'aide d'un disque d'oxacilline 5 µg après incubation de 24 h à 30° C sur milieu non supplémenté en chlorure de sodium, ou à 37° C sur milieu hypersalé (2 à 4 %) avec un inoculum de ~10 <sup>7</sup> UFC/ml. Après 24 h, la croissance des staphylocoques peut être faible dans les conditions précitées. Dans ce cas, l'incubation sera prolongée jusqu'à 48 h. Les souches résistantes à l'oxacilline doivent être interprétées résistantes à toutes les pénicillines (associées ou non à un inhibiteur de -lactamase), aux céphalosporines et aux carbapénèmes. Les souches pénicilline R – oxacilline S sont sensibles aux associations pénicilline + inhibiteur de -lactamase, aux céphalosporines et aux carbapénèmes. Ces molécules sont utilisables dans la limite des indications de l'AMM. Il n'est pas utile de les tester en routine.
Streptomycine	10 UI	8	> 16	15	< 13	Interprétation valable pour néomycine, framycétine, paromomycine, amikacine et isépa-mycine.
Kanamycine	30 UI	8	> 16	17	< 15	
Gentamicine	15 µg (10 UI)	4	> 8	16	< 14	Interprétation valable pour nétilmicine et la résistance est croisée avec l'ensemble des aminosides.
Tobramycine	10 µg	4	> 8	16	< 14	
Erythromycine	15 UI	1	> 4	22	< 17	Interprétation valable pour azithromycine, clarithromycine, dirithromycine et roxithromycine.
<i>Télithromycine</i>	15 µg	≤ 0,5	> 2	≥ 21	< 17	
Spiramycine	100 µg	1	> 4	24	< 19	Interprétation valable pour josamycine et midécamycine.
Lincomycine	15 µg	2	> 8	21	< 17	Interprétation valable pour clindamycine.
Pristinamycine	15 µg	1	> 2	22	< 19	
Dalfopriline-quinupristine	15 µg	0,5	> 2	25	< 19	Pour les souches dont le diamètre est 19 < 25 mm, déterminer la CMI.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau X (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Staphylococcus* spp..**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Péfloxacin	5 µg	1	> 4	22	< 16	Péfloxacin, ofloxacin, lévofloxacin et ciprofloxacine ont une activité similaire sur les staphylocoques. La résistance est croisée entre ces molécules et le résultat obtenu en testant l'une d'entre elles est valable pour les autres.
Ofloxacin	5 µg	1	> 4	22	< 16	
Lévofloxacin (H)	5 µg	1	> 4	20	< 15	
Ciprofloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19	
<i>Moxifloxacin</i>	5 µg	≤ 1	> 2	≥ 21	< 18	
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Interprétation valable pour oxytétracycline et doxycycline.
Minocycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	
Rifampicine	30 µg	0,5	> 16	29	< 14	Interprétation valable pour un traitement intraveineux.
Fosfomycine (H)	50 µg	32	> 32	14	< 14	
Acide fusidique	10 µg	2	> 16	22	< 15	
Teicoplanine (H)	30 µg	4	> 16	17	-	Cf. la remarque ci-dessous pour la détection des souches de <i>S. aureus</i> de sensibilité diminuée aux glycopeptides.
Vancomycine (H)	30 µg	4	> 16	17	-	
Sulfamides	200 µg	64	> 256	17	< 12	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Triméthoprime	5 µg	4	> 8	16	< 12	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.
Triméthoprime/sulfaméthoxazole	1,25+23,75 µg	2/38	> 8/152	16	< 10	Interprétation valable pour les autres associations triméthoprime-sulfamide.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

### Détermination de l'activité *in vitro* des glycopeptides sur *Staphylococcus aureus* : catégorisation clinique des souches suspectées d'être de sensibilité diminuée.

#### Introduction

Des souches de *S. aureus* de sensibilité diminuée aux glycopeptides (GISA, GRSA, Hetero-VISA\* des anglo-saxons) ont été décrites depuis plusieurs années. En France, cette sensibilité diminuée concerne presque exclusivement les souches simultanément résistantes à la méticilline et à la gentamicine.

#### Critères de suspicion de la sensibilité diminuée aux glycopeptides

En routine, par la méthode de diffusion en milieu gélosé lorsque,

- le diamètre de la zone d'inhibition est < 17 mm autour du disque de l'un des deux glycopeptides,
- le diamètre de la zone d'inhibition autour d'un disque de teicoplanine est inférieur d'au moins 3 mm à celui de la vancomycine,
- quelques colonies sont présentes dans la zone d'inhibition de l'un des deux glycopeptides,
- il existe un phénomène d'interaction (synergie ou antagonisme) entre l'un des glycopeptides et un disque d'oxacilline à 5 µg.

En routine, par les méthodes automatisées lorsque les souches sont catégorisées I ou R à au moins l'un des glycopeptide.

(\*) mise en évidence basée sur une analyse de population non réalisée en routine (voir Chesneau, O., A. Morvan and N. El Solh – JAC, 2000, **45**, 887-890.)

*Par un test particulier* : la sensibilité diminuée est suspectée par la présence d'au moins une colonie sur gélose Mueller-Hinton (MH) additionnée de 5 mg/L de teicoplanine, ensemencée par dépôt de 10 µl d'une suspension de 6.10<sup>8</sup> UFC/ml (McFarland 2), après incubation à 35-37°C et lecture à 24 et 48 heures. Il est nécessaire d'inclure dans chaque série de tests un témoin positif (*Staphylococcus epidermidis* CIP en cours de dépôt) et un témoin négatif (*Staphylococcus aureus* ATCC 25923).

Remarque : la gélose cœur-cervelle (BHI agar) additionnée de 6 mg/L de teicoplanine et ensemencée par dépôt de 10 µl d'une suspension de 10<sup>8</sup>UFC/ml (McFarland 0,5) ne permet pas d'obtenir des résultats reproductibles d'un lot à l'autre.

#### Catégorisation

Pour les souches suspectes d'être de sensibilité diminuée aux glycopeptides, seule la détermination des CMI de la vancomycine et de la teicoplanine dans les conditions décrites dans ce communiqué annuel (page 3 - dilution en milieu Mueller Hinton gélosé) permet leur catégorisation clinique (S,I,R) selon les concentrations critiques indiquées ci-dessus.

Les CMI peuvent aussi être déterminées par toute technique ayant démontré, pour ces antibiotiques, son équivalence avec la technique de référence.

**Tableau XI – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Enterococcus* spp..**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Ampicilline	10 µg	4	> 16	19	< 14	La sensibilité des entérocoques aux pénicillines est appréciée à l'aide d'un disque d'ampicilline 10 µg. L'interprétation est valable pour pénicilline G, amoxicilline, mezlocilline, pipéracilline et imipénème. Le traitement des infections sévères à entérocoques ampicilline S/I nécessite des doses élevées d'une pénicilline associée à gentamicine (ou streptomycine) pour obtenir une activité bactéricide.
Streptomycine Kanamycine Gentamicine	500 µg 1000 µg 500 µg	250 250 250	> 500 > 500 > 500	14 14 17	< 12 < 10 < 11	Seuls les disques fortement chargés de streptomycine (S), kanamycine (K) et gentamicine (G) doivent être utilisés pour les streptocoques et entérocoques, espèces naturellement résistantes à bas niveau (BNR) aux aminoglycosides. Ils permettent de détecter une résistance acquise de haut niveau (HNR) qui abolit l'effet synergique bactéricide de l'association des aminoglycosides concernés avec les pénicillines. Les autres aminoglycosides restent utilisables en association. <u>Interprétation des résultats :</u> S <sup>BNR</sup> , K <sup>BNR</sup> et G <sup>BNR</sup> ( D ; CMI c) : synergie possible avec les pénicillines en cas de sensibilité à ces derniers antibiotiques. S <sup>HNR</sup> : la streptomycine ne peut être utilisée. K <sup>HNR</sup> : kanamycine, amikacine et isépanamicine ne peuvent être utilisées. G <sup>HNR</sup> : kanamycine, tobramycine, dibécacine, gentamicine, sisomicine, amikacine, isépanamicine et nétilmicine ne peuvent être utilisées. Pour les valeurs « intermédiaires » des diamètres, le niveau de résistance devra être confirmé par dilution en agar ou en bouillon contenant 500 µg/ml de S, K ou G. (HNR : CMI > 500 µg/ml). Les combinaisons S <sup>HNR</sup> + K <sup>HNR</sup> , K <sup>HNR</sup> + G <sup>HNR</sup> et S <sup>HNR</sup> + K <sup>HNR</sup> + G <sup>HNR</sup> sont possibles.
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Interprétation valable pour oxytétracycline et doxycycline.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XI (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Enterococcus* spp..**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Erythromycine	15 UI	1	> 4	22	< 17	Interprétation valable pour azithromycine, clarithromycine, dirithromycine et roxithromycine.
Lincomycine	15 µg	2	> 8	21	< 17	Résistance naturelle de <i>E. faecalis</i> .
Clindamycine	2 UI	2	> 2	15	< 15	Résistance naturelle de <i>E. faecalis</i> .
Pristinamycine	15 µg	1	> 2	22	< 19	Spectre limité à <i>E. faecium</i> .
Dalfopristine-quinupristine	15 µg	0,5	> 2	25	< 19	Spectre limité à <i>E. faecium</i> .
Lévofoxacine (H)	5 µg	1	> 4	20	< 15	
Trovafloxacine	10 µg	1	> 2	20	< 17	
Teicoplanine (H)	30 µg	4	> 16	17	-	Pour les diamètres < 17 mm, il est recommandé de mesurer la CMI.
Vancomycine (H)	30 µg	4	> 16	17	-	Pour les diamètres < 17 mm, il est recommandé de mesurer la CMI.
Triméthoprim/sulfaméthoxazole	1,25/23,75 µg	2/38	> 8/152	16	< 10	
Nitrofuranes	300 µg	32	> 128	17	< 14	Interprétation valable uniquement pour les souches isolées des urines.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XII – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Streptococcus pneumoniae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Pénicilline G	-	0,06	> 1	-	-	<p>La résistance acquise à la pénicilline des pneumocoques est croisée avec toutes les autres -lactamines. La sensibilité des pneumocoques à la pénicilline G est appréciée avec un disque d'oxacilline 5 µg (OXA-5) selon les critères suivants :</p> <p>- diamètre OXA-5 ≥ 26 mm - souche sensible à pénicilline G. Cette interprétation est prédictive de l'activité des autres -lactamines.</p> <p>- diamètre OXA-5 &lt; 26 mm - souche I ou R à pénicilline G. Ce test ne permet pas de distinguer les souches I (BNR, bas niveau de résistance) des souches R (HNR, haut niveau de résistance) à la pénicilline G, ni le niveau de résistance croisée aux autres -lactamines, variable selon les molécules.</p> <p>La méthode des disques ne peut être utilisée pour déterminer valablement l'activité <i>in vitro</i> des -lactamines sur les souches OXA-5 &lt; 26 mm.</p> <p>En cas d'infection sévère, d'échec clinique ou devant toute souche de sensibilité diminuée (OXA-5 &lt; 26 mm), il y a lieu de déterminer la CMI de la pénicilline G et celle des -lactamines dont les propriétés pharmacodynamiques sont compatibles avec une efficacité thérapeutique : amoxicilline, imipénème, céfuroxime, céfotaxime, ceftriaxone, céfépime, cefpirome. Les concentrations critiques indiquées ci-contre sont valables pour une administration par voie parentérale et, à titre provisoire, pour les formes orales d'amoxicilline et de céfuroxime.</p>
Oxacilline	5 µg	0,06	-	26	-	
Ampicilline	-	0,5	> 2	-	-	
Amoxicilline	-	0,5	> 2	-	-	
Céfuroxime	-	0,5	> 2	-	-	
Céfotaxime (H)	-	0,5	> 2	-	-	
Ceftriaxone	-	0,5	> 2	-	-	
Céfépime (H)	-	0,5	> 2	-	-	
Cefpirome (H)	-	0,5	> 2	-	-	
Imipénème (H)	-	0,5	> 2	-	-	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XII (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Streptococcus pneumoniae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Streptomycine Kanamycine Gentamicine	500 µg 1000 µg 500 µg	250 250 250	> 500 > 00 > 500	14 14 17	< 12 < 10 < 11	Seuls les disques fortement chargés de streptomycine (S), kanamycine (K) et gentamicine (G) doivent être utilisés pour les pneumocoques, espèces naturellement résistantes à bas niveau (BNR) aux aminoglycosides. Ils permettent de détecter une résistance acquise de haut niveau (HNR) qui abolit l'effet synergique bactéricide de l'association des aminoglycosides concernés avec les pénicillines. Les autres aminoglycosides restent utilisables en association. <u>Interprétation des résultats :</u> S <sup>BNR</sup> , K <sup>BNR</sup> et G <sup>BNR</sup> ( D ; CMI c) : synergie possible avec les pénicillines en cas de sensibilité à ces derniers antibiotiques. S <sup>HNR</sup> : la streptomycine ne peut être utilisée. K <sup>HNR</sup> : kanamycine, amikacine et isépanamicine ne peuvent être utilisées. Pour les valeurs « intermédiaires » des diamètres, le niveau de résistance devra être confirmé par dilution en agar ou en bouillon contenant 500 µg/ml de S, K ou G. (HNR : CMI > 500 µg/ml). La combinaison S <sup>HNR</sup> + K <sup>HNR</sup> est possible.
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Interprétation valable pour oxytétracycline et doxycycline.
Erythromycine  Télithromycine Lincomycine Pristinamycine	15 UI  15 µg 15 µg 15 µg	1  ≤ 0,5 2 1	> 4  > 2 > 8 > 2	22  ≥ 21 21 22	< 17  < 17 < 17 -	Interprétation valable pour azithromycine, clarithromycine, dirithromycine et roxithromycine.  Interprétation valable pour clindamycine La méthode des disques ne peut être utilisée pour déterminer valablement l'activité <i>in vitro</i> de la pristinamicine si < 22 mm.
Triméthoprim/sulfaméthoxazole	1,25/23,75 µg	2/38	> 8/152	16	< 10	Interprétation valable pour les autres associations triméthoprim-sulfamide.
Fosfomycine (H)	50 µg	32	> 32	14	< 14	Interprétation valable pour traitement intraveineux.
Sparfloxacin Lévoﬂoxacin Trovaﬂoxacin	5 µg 5 µg 10 µg	1 2 1	> 2 > 4 > 2	20 17 20	< 16 < 15 < 17	
Teicoplanine (H) Vancomycine (H)	30 µg 30 µg	4 4	> 16 > 16	17 17	- -	Pour les diamètres < 17 mm, il est recommandé de déterminer la CMI. Pour les diamètres < 17 mm, il est recommandé de déterminer la CMI.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XIII – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Streptococcus* spp. (*S. pneumoniae* excepté).**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Pénicilline G	6 µg (10 UI)	0,25	> 16	29	< 8	Interprétation valable pour phénoxyéthyl-pénicilline.
Ampicilline	10 µg	4	> 16	19	< 14	Interprétation valable pour bacampicilline, métampicilline, pivampicilline.
Amoxicilline	25 µg	4	> 16	21	< 14	
Streptomycine	500 µg	250	> 500	14	< 12	Seuls les disques fortement chargés de streptomycine (S), kanamycine (K) et gentamicine (G) doivent être utilisés pour les streptocoques et entérocoques, espèces naturellement résistantes à bas niveau (BNR) aux aminoglycosides. Ils permettent de détecter une résistance acquise de haut niveau (HNR) qui abolit l'effet synergique bactéricide de l'association des aminoglycosides concernés avec les pénicillines. Les autres aminoglycosides restent utilisables en association. <u>Interprétation des résultats :</u> S <sup>BNR</sup> , K <sup>BNR</sup> et G <sup>BNR</sup> ( D ; CMI c) : synergie possible avec les pénicillines en cas de sensibilité à ces derniers antibiotiques. S <sup>HNR</sup> : la streptomycine ne peut être utilisée. K <sup>HNR</sup> : kanamycine, amikacine et isépanicine ne peuvent être utilisées. Pour les valeurs « intermédiaires » des diamètres, le niveau de résistance devra être confirmé par dilution en agar ou en bouillon contenant 500 µg/ml de S, K ou G. (HNR : CMI > 500 µg/ml). La combinaison S <sup>HNR</sup> + K <sup>HNR</sup> est possible.
Kanamycine	1000 µg	250	> 500	14	< 10	
Gentamicine	500 µg	250	> 500	17	< 11	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XIII (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Streptococcus* spp. (*S. pneumoniae* excepté).**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Interprétation valable pour thiamphénicol.
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	Interprétation valable pour oxytétracycline et doxycycline.
Erythromycine	15 UI	1	> 4	22	< 17	Interprétation valable pour azithromycine, clarithromycine, dirithromycine et roxithromycine.
<i>Télithromycine</i>	15 µg	≤ 0,5	> 2	≥ 21	< 17	
Lincomycine	15 µg	2	> 8	21	< 17	
Clindamycine	2 UI	2	> 2	15	< 15	
Pristinamycine	15 µg	1	> 2	22	< 19	
Lévofoxacine	5 µg	2	> 4	17	< 15	
Trovafloxacine	10 µg	1	> 2	20	< 17	
Teicoplanine (H)	30 µg	4	> 16	17	-	Pour les diamètres < 17 mm, il est recommandé de déterminer la CMI.
Vancomycine (H)	30 µg	4	> 16	17	-	Pour les diamètres < 17 mm, il est recommandé de déterminer la CMI.
Rifampicine	30 µg	4	> 16	19	< 14	
Triméthoprim/sulfaméthoxazole	1,25/23,75 µg	2/38	8/152	16	< 10	Interprétation valable pour les autres associations triméthoprim-sulfamide.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier



**Tableau XIV – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Haemophilus influenzae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Ampicilline	2 µg	-	> 1	-	< 20	<p>La production de <math>\beta</math>-lactamase détectée par une technique chromogénique dès l'isolement, confère la résistance aux amino-, carboxy- et uréido-pénicillines. L'activité des ces <math>\beta</math>-lactamines est restaurée lors de l'association avec un inhibiteur de <math>\beta</math>-lactamase.</p> <p>La détection de souches de sensibilité diminuée aux <math>\beta</math>-lactamines (souches non productrices de <math>\beta</math>-lactamase) peut se faire à l'aide d'un disque d'ampicilline 2 µg (diamètre &lt; 20 mm) ou, à défaut, d'un disque de céfalotine 30 µg (diamètre &lt; 17 mm). Certaines de ces souches donnant une croissance faible sur milieu HTM, on utilise alors une gélose chocolat PolyViteX . Cette résistance de faible niveau aux aminopénicillines, est plus marquée pour les céphalosporines de première génération et l'imipénème. L'activité des céphalosporines de troisième génération n'est que faiblement altérée. Les conséquences cliniques de cette résistance ne sont pas connues.</p>
Céfalotine (H)	30 µg	-	> 8	-	< 17	
Amoxicilline/ac. clavulanique	20/10 µg	4/2	-	21	-	
Céfotaxime (H)						Sont utilisables en l'absence de critères d'interprétation, car il n'existe pas actuellement d'échec clinique dû à un mécanisme de résistance.
Ceftriaxone						
Tétracycline	30 UI	2	> 4	23	18	Interprétation valable pour les autres tétracyclines.

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XIV (suite) -Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Haemophilus influenzae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Triméthoprim/sulfaméthoxazole	1,25/23,75 µg	,5/9,5	> 1/19	24	-	Ne peut être testé sur gélose chocolat. Utiliser le milieu HTM.
Chloramphénicol	30 µg	2	> 4	28	< 24	
Rifampicine	30 µg	2	> 4	24	< 20	
Kanamycine	30 UI	8	> 16	18	< 15	
Gentamicine	15 µg	2	> 4	16	< 14	
Macrolides Lincosamides Pristinamycine						L'étude de ces molécules n'est pas justifiée car <i>H. influenzae</i> apparaît généralement intermédiaire aux macrolides avec un cycle à 14 et 15 atomes et à la pristinamycine, et résistant aux macrolides avec un cycle à 16 atomes et aux lincosamides.
Ofloxacin	5 µg	1		22	-	
Lévofoxacin	5 µg	1		22	-	
Ciprofloxacine	5 µg	1		22	-	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Tableau XV – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Neisseria meningitidis*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Pénicilline G	-	0,06	> 1	-	-	La détection d'une sensibilité diminuée aux pénicillines est effectuée en routine à l'aide d'un disque d'oxacilline (1 µg ou 5 µg) selon les critères suivants : oxa 1 µg 11 mm ou oxa 5 µg 18 mm, souche sensible aux pénicillines ; oxa 1 µg < 11 mm ou oxa 5 µg < 18 mm, sensibilité diminuée à la pénicilline G et/ou amoxicilline à confirmer par la détermination des CMI. La résistance à haut niveau aux pénicillines par production de -lactamase est extrêmement rare. Elle est détectée par une technique chromogénique.
Amoxicilline	-	0,25	> 2	-	-	
Oxacilline	5 µg	-	-	18	-	
Oxacilline	1 µg	-	-	11	-	
Céfotaxime (H)	-	0,25	-	-	-	
Ceftriaxone	-	0,25	-	-	-	
Chloramphénicol	30 µg	2	> 4	30	-	
Rifampicine	30 µg	0,25	-	30	-	Antibiotique utilisé uniquement en prophylaxie.

**Tableau XVI – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Neisseria gonorrhoeae*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Pénicilline G	-	0,06	> 1	-	-	La production de $\beta$ -lactamase doit être détectée par une technique chromogénique dès l'isolement. Elle confère la résistance aux amino-, carboxy- et uréido-pénicillines. L'activité de ces $\beta$ -lactamines est restaurée lors de l'association avec un inhibiteur de $\beta$ -lactamase. La détection d'une sensibilité diminuée aux pénicillines sera effectuée en routine par détermination de la CMI de la pénicilline G sur gélose chocolat PolyViteX ; si la méthode E-test est utilisée, ensemercer par écouvillonnage.
Amoxicilline	-	0,25	> 2	-	-	
Ceftriaxone		0,25	-			
Spectinomycine	100 $\mu$ g	64	> 64	20	< 20	
Chloramphénicol		4	> 16			
Tétracycline	30 UI	1	> 4	-	< 19	Réponse valable pour la doxycycline et la minocycline. Un diamètre < 19 mm fait suspecter une résistance due à la présence du gène tetM.
Erythromycine		1	> 4	-	-	
Acide nalidixique	30 $\mu$ g			-	< 25	La détection des souches de sensibilité diminuée aux fluoroquinolones est effectuée à l'aide d'un disque d'acide nalidixique (30 $\mu$ g). Si le diamètre est inférieur à 25 mm, contrôler les CMI de l'ofloxacin ou de la ciprofloxacine.
Ciprofloxacine	-	0,06	> 0,06	-	-	
Ofloxacin	-	0,12	> 0,12	-	-	

**Tableau XVII – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Campylobacter* spp. et *Helicobacter pylori*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Ampicilline	10 µg	4	> 16	19	< 14	Cf règle (1).
Amoxicilline/ac. clavulanique	20/10 µg	4/2	> 16/2	21	< 14	Cf règle (1).
Céfalotine (H)	30 µg	8	> 32	18	< 12	Cf règle (1).
Céfotaxime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15	Cf règle (1).
Imipénème (H)	10 µg	4	> 8	22	< 17	Cf règle (1).
Streptomycine	10 UI	8	> 16	15	< 13	Cf règles (1) et (2).
Gentamicine	15 µg (10 UI)	4	> 8	16	< 14	Cf règles (1) et (2).
Kanamycine	30 UI	8	> 16	17	< 15	Cf règles (1) et (2).
Tobramycine	10 µg	4	> 8	16	< 14	Cf règles (1) et (2).
Erythromycine	15 UI	1	> 4	22	< 17	Cf règles (1). Interprétation valable pour clarithromycine
Acide nalidixique	30 µg	8	> 16	20	< 15	Cf règle (1).
Ciprofloxacine	5 µg	1	> 2	22	< 19	Cf règle (1).
Tétracycline	30 UI	4	> 8	19	< 17	
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

**Règles de lecture interprétative**

Remarques : selon les antibiotiques, la corrélation entre CMI et diamètres est parfois difficile à établir. En cas doute sur les résultats obtenus par diffusion en milieu gélosé, il y a lieu de déterminer les CMI par une méthode de référence ou toute méthode ayant montré, pour les antibiotiques concernés, son équivalence avec la méthode de référence.

(1) Pour *Campylobacter* spp., une absence de zone d'inhibition autour des disques de -lactamines, aminosides, macrolides ou quinolones traduit une résistance de haut niveau.

(2) Compte tenu des conditions d'incubation (anaérobiose ou microaérobiose), les diamètres des zones d'inhibition autour des disques d'aminosides sont toujours réduits.

**Tableau XVIII – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour *Helicobacter pylori*.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Erythromycine	15 UI	1	> 4	22	< 17	Interprétation valable pour clarithromycine

**Remarques**

Seule la détermination de la sensibilité à l'érythromycine est judicieuse. La diffusion en milieu gélosé n'est pas recommandée pour tester la sensibilité à l'amoxicilline de *Helicobacter pylori* car pour l'instant, quelques souches de sensibilité diminuée (CMI > 0,1 mg/l) ont été décrites, mais il ne paraît pas utile de conditionner l'utilisation de l'amoxicilline aux résultats d'un test *in vitro*.

**Tableau XIX – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour les anaérobies stricts.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Amoxicilline		0,5	> 1	-	-	Interprétation pour les anaérobies à Gram négatif. Cf. règles (1) et (2).
Amoxicilline	25 µg	4	> 16	21	< 14	Interprétation pour les anaérobies à Gram positif. Cf. règle (3). Interprétation valable pour pénicilline G et ampicilline.
Amoxicilline/ac. clavulanique	20/10 µg	4/2	> 16/2	21	< 14	Cf. règle (4).
Ticarcilline (H)	75 µg	16	64	22	< 18	Pour <i>Bacteroides fragilis</i> , l'interprétation est valable pour la pipéracilline.
Ticarcilline/ac. clavulanique (H)	75/10 µg	16/2	> 64/2	22	< 18	
Pipéracilline (H)	75 µg	8	> 64	20	< 12	Pour <i>Bacteroides fragilis</i> , l'interprétation est valable pour la ticarcilline.
Pipéracilline/tazobactam (H)	75/10 µg	8/4	> 64/4	21	< 14	
Imipénème (H)	10 µg	4	> 8	22	< 17	Cf. règle (4).
Céfoxitine (H)		-	> 32	-	-	Cf. règle (5).
Céfotétan (H)		-	> 32	-	-	
Céfotaxime (H)	30 µg	4	> 32	21	< 15	

(H) – antibiotique distribué en milieu hospitalier

#### Règles de lecture interprétative

Remarque : selon les antibiotiques, la corrélation entre CMI et diamètres est parfois difficile à établir et diffère selon les espèces, en particulier pour les espèces à croissance lente. En cas doute sur les résultats obtenus par diffusion en milieu gélosé, il y a lieu de déterminer les CMI par une méthode de référence ou toute méthode ayant montré, pour les antibiotiques concernés, son équivalence avec la méthode de référence.

- (1) Chez *Fusobacterium*, la production de β-lactamase détectée par une méthode chromogénique dès l'isolement, confère la résistance aux amino-, carboxy- et uréido-pénicillines. L'activité est restaurée lors de l'association avec un inhibiteur de β-lactamase.
- (2) Chez *Prevotella*, la production de β-lactamase, confère la résistance aux amino-pénicillines, céphalosporines 1<sup>ère</sup> génération, céfuroxime et aux céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération orales. L'activité est restaurée lors de l'association avec un inhibiteur de β-lactamase.
- (3) Chez *Clostridium butyricum*, *C. clostridioforme* et *C. ramosum*, la production de β-lactamase est détectée par une méthode chromogénique dès l'isolement. Seule la β-lactamase de *C. butyricum* est inhibée, aux concentrations thérapeutiques, par les inhibiteurs de β-lactamase.
- (4) La résistance à l'imipénème est décrite en France chez *Bacteroides fragilis* (carbapénémase) et *B. distasonis*. La résistance est croisée pour l'ensemble des β-lactamines même associées à des inhibiteurs de β-lactamases.
- (5) Pour *Bacteroides* du groupe *fragilis*, interpréter I tout résultat S aux céphalosporines de 3<sup>ème</sup> génération (β-lactamase chromosomique).

**Tableau XIX (suite) – Concentrations, diamètres critiques et règles de lecture interprétative pour les anaérobies stricts.**

Antibiotique	Charge du disque	Concentrations critiques (mg/L)		Diamètres critiques (mm)		Remarques
		S	R	S	R	
Chloramphénicol	30 µg	8	> 16	23	< 19	Lecture obligatoire à 48h : risque de faux sensibles après 24h d'incubation. Concerne les anaérobies isolés d'infections dentaires. Ne pas tester pour les <i>Bacteroides</i> du groupe <i>fragilis</i> .
Clindamycine	2 UI	2	> 2	15	< 15	
Spiramycine	100 µg	1	> 4	24	< 19	
Pristinamycine	15 µg	1	> 2	22	< 19	
Vancomycine	30 µg	4	> 16	17	-	Interprétation valable pour les anaérobies à Gram positif.
Teicoplanine	30 µg	4	> 16	17	-	Interprétation valable pour les anaérobies à Gram positif.
Ofloxacine	5 µg	1	> 4	22	< 16	Seulement pour <i>Peptostreptococcus</i> et les propionibactéries en cas d'infection osseuse ou cérébrale.
Rifampicine	30 µg	4	> 16	19	< 14	Interprétation valable pour l'ornidazole . Cf règle (6).
Métronidazole	Comprimé 16 µg	4	> 16	-	< 21	
Vancomycine	5 µg	-	-	-	< 10	Aide à l'identification des bacilles à Gram négatif . Cf règle (7).
Kanamycine	1000 µg	-	-	-	< 10	Aide à l'identification des bacilles à Gram négatif . Cf règle (7).
Colistine	10 µg	-	-	-	< 10	Aide à l'identification des bacilles à Gram négatif . Cf règle (7).

**Règles de lecture interprétative (suite)**

- (6) Les comprimés Néosentabs<sup>®</sup> (Rosco) permettent l'étude de la sensibilité au métronidazole par diffusion en milieu gélosé. Par cette technique, les diamètres obtenus avec des souches sensibles sont > 35 mm. Chez *Clostridium* et les anaérobies à Gram négatif, la résistance aux 5 nitro-imidazoles est très rare. Elle doit être confirmée par détermination de la CMI. Certaines souches apparaissent faussement résistantes si l'anaérobiose n'est pas correcte. La résistance à haut niveau est exceptionnelle. En France, 2 à 3 % des souches de *Bacteroides* du groupe *fragilis* ont une sensibilité diminuée aux 5-nitro-imidazoles (CMI de 8 à 16 mg/l).
- (7) Ces trois disques, de charge particulière, constituent une aide précieuse à l'identification des principaux bacilles à Gram négatif : les *Bacteroides* du groupe *fragilis* sont résistants à kanamycine, colistine et vancomycine ; *Prevotella* est résistante à kanamycine et vancomycine, la sensibilité à la colistine variant selon les espèces ; *Porphyromonas* est sensible à la vancomycine et résistant à kanamycine et colistine ; *Fusobacterium* est sensible à kanamycine et colistine, résistant à la vancomycine.